

III 臨床編

III-15 血液疾患・その他

用語	かな	欧文表記	略語	同義語・関連語	解説
インヒビターを有する血友病	いんひびたーをゆうするけつゆうびょう	hemophilia with an inhibitor			第VIII因子に対する抗体産生が最も多い。血友病Aインヒビターは輸注した第VIII因子に対する同種抗体が生じ、輸注不応、出血傾向を生じる。
過粘稠症候群	かねんちょうしょうこうぐん	hyperviscosity syndrome	HVS		血液粘度が高くなることにより重篤な中枢神経症状、眼症状、出血症状などを合併する。
急性薬物中毒	きゅうせいやくぶつちゅうどく	acute drug intoxication			薬物の過剰摂取や過剰投与などにより中毒症状、腎不全や肝不全などの臓器障害が起きている状態である。
血液型不適合妊娠	けつえきがたふてきごうにんしん	blood type incompatible pregnancy			母児間で血液型不適合がある場合に、母体の血液中に児の赤血球に対する抗体が生じた場合、胎盤を通じて児の赤血球に溶血を生じ、胎児貧血による心不全、胎児水腫を生じる病態である。
真性多血症	しんせいいたけつしょう	polycythemia vera	PV		赤血球数および総血液量の著しい増加を来し、通常は白血球および血小板増加、脾腫を特徴とする骨髓増殖性腫瘍である。
白血球増多症	はっけつきゅうぞうたしょう	hyperleukocytosis			白血球数100,000/ $\mu$ L以上の状態である。播種性血管内凝固、腫瘍崩壊症候群のリスクが増加する。さらに血管内で白血球塞栓が生じ、組織の低酸素状態を誘導する可能性がある。